

## University of Groningen

### Het intraveneuze nephrogram

Maus, Frits Coenraad

**IMPORTANT NOTE:** You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

*Document Version*

Publisher's PDF, also known as Version of record

*Publication date:*

1964

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

*Citation for published version (APA):*

Maus, F. C. (1964). *Het intraveneuze nephrogram*. [, Rijksuniversiteit Groningen]. [s.n.].

**Copyright**

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

**Take-down policy**

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

## STELLINGEN

1. Bij verdenking op een omschreven proces in het nierparenchym dient nephrotomografie te geschieden.
2. De vascularisatie van het hypernephroom blijkt niet alleen gekarakteriseerd te zijn door een abnormale morfologie maar er bestaat tevens een gewijzigde circulatiesnelheid.
3. Bij patiënten jonger dan 40 jaar kan postoperatieve behandeling met anti-stollingsmiddelen geïndiceerd zijn. Dit geldt in het bijzonder wanneer er zich ontstekingsprocessen in de onderbuik bevonden.
4. Het verdient aanbeveling gedurende stereotactische operaties eerst tijdelijke uitschakeling van de te laederen hersendelen te bewerkstelligen. Dit is onder andere mogelijk door middel van verhitting met behulp van hoogfrequente stroom.  
Brodkey J. S., Miyazaki Y., Ervin F. R., Mark V. H.,  
J. of Neurosurgery, 1964, vol 21 - 49.
5. Bij de diagnostiek en behandeling van het carcinoma mammae is het volgen van een vast schema belangrijker dan de keuze van dit schema.
6. Alvorens over te gaan tot operatieve behandeling van een mitraal-vitium dient bepaling van het bloedvolumen verricht te worden.  
Likoff W., Berkowitz D., Seyen S., Strauss H., Reale A.  
Am. Heart J., 1955, 49-1.
7. Het gebruik van geneesmiddelen welke acetosal bevatten is gecontraïndiceerd bij patiënten met een ulcuslijden. Dit geldt a fortiori bij patiënten die een maagoperatie hebben ondergaan.
8. Oesophagoscopie is voor het aantonen van varices in de oesophagus een gevaarlijk, onbetrouwbaar en daarom overbodig onderzoek.
9. Het is van belang dat de zorg voor de geestelijke gezondheid van de jeugd in belangrijke mate behartigd wordt door de Jeugd Psychiatrische Diensten.  
Kraft T. B. Voordrachtenreeks Ned. Ver. Psychiaters in  
Dienstverband, 1964, No. 18. Uitg. Boom-Meppel.
10. Op theoretische gronden is de voorbestraling bij de behandeling van het carcinoma mammae te verkiezen boven nabestraling. Ook bij de behandeling van andere maligne gezwellen dient de voorbestraling een belangrijke plaats in te nemen.
11. In verband met het veelvuldig voorkomen van kleurenblindheid is rood als onveilig-signaal ongeschikt. Onderbroken lichtsignalen van andere kleur verdienen de voorkeur.

## STELLINGEN

1. Bij verdenking op een omschreven proces in het nierparenchym dient nephrotomografie te geschieden.
2. De vascularisatie van het hypernephroom blijkt niet alleen gekarakteriseerd te zijn door een abnormale morfologie maar er bestaat tevens een gewijzigde circulatiesnelheid.
3. Bij patiënten jonger dan 40 jaar kan postoperatieve behandeling met anti-stollingsmiddelen geïndiceerd zijn. Dit geldt in het bijzonder wanneer er zich ontstekingsprocessen in de onderbuik bevonden.
4. Het verdient aanbeveling gedurende stereotactische operaties eerst tijdelijke uitschakeling van de te laederen hersendelen te bewerkstelligen. Dit is onder andere mogelijk door middel van verhitting met behulp van hoogfrequente stroom.  
Brodkey J. S., Miyazaki Y., Ervin F. R., Mark V. H.,  
J. of Neurosurgery, 1964, vol 21 - 49.
5. Bij de diagnostiek en behandeling van het carcinoma mammae is het volgen van een vast schema belangrijker dan de keuze van dit schema.
6. Alvorens over te gaan tot operatieve behandeling van een mitraal-vitium dient bepaling van het bloedvolumen verricht te worden.  
Likoff W., Berkowitz D., Seyen S., Strauss H., Reale A.  
Am. Heart J., 1955, 49-1.
7. Het gebruik van geneesmiddelen welke acetosal bevatten is gecontraïndiceerd bij patiënten met een ulcuslijden. Dit geldt a fortiori bij patiënten die een maagoperatie hebben ondergaan.
8. Oesophagoscopie is voor het aantonen van varices in de oesophagus een gevaarlijk, onbetrouwbaar en daarom overbodig onderzoek.
9. Het is van belang dat de zorg voor de geestelijke gezondheid van de jeugd in belangrijke mate behartigd wordt door de Jeugd Psychiatrische Diensten.  
Kraft T. B. Voordrachtenreeks Ned. Ver. Psychiaters in  
Dienstverband, 1964, No. 18. Uitg. Boom-Meppel.
10. Op theoretische gronden is de voorbestraling bij de behandeling van het carcinoma mammae te verkiezen boven nabestraling. Ook bij de behandeling van andere maligne gezwellen dient de voorbestraling een belangrijke plaats in te nemen.
11. In verband met het veelvuldig voorkomen van kleurenblindheid is rood als onveilig-signaal ongeschikt. Onderbroken lichtsignalen van andere kleur verdienen de voorkeur.